

Gesundheitsfragebogen für Patienten (PHQ-D)

Auswertung Fragen 1 – 2 (einschließlich ICD-10-Klassifikation)

<p>Somatoformes Syndrom ≥ 3 x</p> <p>V. a. Somatisierungsstörung (F45.0)</p> <p>V. a. Undiff. Somatisierungsstörung (F45.1)</p> <p>V. a. Somatoforme autonome Funktionsstörung (F45.3)</p> <p>Bei Fehlen adäquater organischer Ursachen</p>	
---	--

<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px dashed red;">1 x</td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px dashed red;">oder</td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px dashed red;">2 x</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">+</td> <td></td> <td style="text-align: center;">+</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1–3 x</td> <td></td> <td style="text-align: center;">0–2 x</td> </tr> </table> <p>Andere Depressive Syndrome</p> <p>V. a. Minor Depression/ n.n.b. depressive Episode (F32.9)</p> <p>V. a. Minor Depression/ n.n.b. rezid. depressive Episode (F33.9)</p> <p>V. a. Dysthymia (F34.1)</p>	1 x	oder	2 x	+		+	1–3 x		0–2 x	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px dashed red;">1 x</td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px dashed red;">oder</td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px dashed red;">2 x</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">+</td> <td></td> <td style="text-align: center;">+</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">≥ 4 x</td> <td></td> <td style="text-align: center;">≥ 3 x</td> </tr> </table> <p>Major Depressives Syndrom</p> <p>V. a. Erstmalige depressive Episode (leicht F32.0) (mittel F32.1) (schwer F32.2)</p> <p>V. a. Rezid. depressive Episode (leicht F33.0) (mittel F33.1) (schwer F33.2)</p>	1 x	oder	2 x	+		+	≥ 4 x		≥ 3 x	
1 x	oder	2 x																		
+		+																		
1–3 x		0–2 x																		
1 x	oder	2 x																		
+		+																		
≥ 4 x		≥ 3 x																		

Gesundheitsfragebogen für Patienten (PHQ-D)

Auswertung Fragen 3 – 5 (einschließlich ICD-10-Klassifikation)

	4 x
	und
	≥ 4 x
Paniksyndrome	
V. a. Panikstörung	(F41.0)
V. a. Agoraphobie mit Panikstörung	(F40.01)

	1 x
	und
	≥ 3 x
Andere Angstsyndrome	
V. a. Generalisierte Angststörung	(F41.1)
V. a. n.n.b. Angststörung	(F41.9)

Gesundheitsfragebogen für Patienten (PHQ-D)

Auswertung Fragen 6 – 10 (einschließlich ICD-10-Klassifikation)

<p>3 x</p> <hr/> <p>V. a. Bulimia nervosa (F50.2)</p> <hr/> <p>1 x</p>	<p>3 x</p> <hr/> <p>V. a. „Binge-Eating“-Störung / n.n.b. Essstörung (F50.9)</p> <hr/> <p>0 x</p>	
<p>≥ 1 x</p> <p>Alkoholsyndrom V. a. Alkoholmissbrauch (F10.1) V. a. Alkoholabhängigkeit (F10.2)</p>		